

Utrechtseweg 4<sup>b</sup>  
3927 AV Renswoude

t. +31 (0)318 743 456  
f. +31 (0)318 743 450

info@valleienwetering.nl  
www.valleienwetering.nl

Beste veehouder,

Zoals u ook in de kranten kunt lezen, zitten we nog midden in de Blauwtonguitbraak. Hieronder volgt dus weer een stukje over deze ziekte. Verder belichten we wormbesmettingen en vragen we aandacht voor de pinkengriepvaccinatie.

## Blauwtong

Het Blauwtongvirus blijft nog steeds door razen. We zijn druk met het behandelen van zieke dieren en ook met euthanaseren van dieren waarvan geen hoop is op genezing. Regelmatig krijgen we de vraag of vaccinatie heeft geholpen. Het Blauwtongvirus waar we nu mee te maken hebben is erg potent. Het kan daardoor door de weerstand, opgebouwd door vaccinatie, heen breken.

Volgens de specialisten van de GD heeft vaccinatie zeker bij de schapen zin, en dat is ook onze ervaring. Vorig jaar ging 75% van de zieke dieren dood, nu zou dat rond de 5% liggen. Bovendien knappen zieke dieren beter op, soms zonder behandeling. De GD heeft geadviseerd om de schapen vanaf 4-6 weken na 1<sup>e</sup> vaccinatie nogmaals te vaccineren om de hoeveelheid antilichamen nogmaals te verhogen. We hebben inmiddels een aantal koppels voor de 2<sup>e</sup> keer gevaccineerd.

Bij de koeien is het effect van de vaccinatie minder duidelijk. Er zijn gevaccineerde bedrijven waar nog geen dieren ziek zijn geworden door BT. Maar er waren ook op gevaccineerde bedrijven zieke koeien door BT. Onze voorzichtige indruk is toch, dat de problemen bij gevaccineerde koeien minder groot zijn. Wellicht zal via de GD hierover nog meer bekend worden in de komende maanden.

Als u dieren met BT hebt is het advies:

-Geef pijnstilling, liefst zo snel mogelijk na het begin van de ziekte. Temperatuur koeien die minder geven of kreupel lopen en spuit bij koorts een pijnstillertje:

\*Rimadyl: 1 ml/35 kg, wachttijd melk: 0 dagen, na 2-3 dagen herhalen

\*Kelafer: 1 ml/33kg, wachttijd melk: 0 dagen, na 24 uur herhalen

\*Melovem 30: 1 ml/60 kg, wachttijd melk: 5 dagen, na 2-3 dagen herhalen

-Bij ernstige verschijnselen: geef antibiotica, zoals peniciline of engemycine

**-Gebruik 1 naald per dier, zodat u het virus niet naar andere koeien overbrengt via de naald!**

Stal dieren voor de schemering op en laat de ventilator draaien in de stal, knutten houden niet van trek.

### **Wormbesmettingen**

Via het Tankmelkonderzoek Wormen hebben we de eerste uitslagen van dit weideseizoen binnen gekregen. In het onderzoek van augustus wordt gekeken of er antilichamen tegen longworm en/of maagdarmwormen in de tankmelk zitten. Bedrijven met veel antilichamen kunnen de melkkoeien ontwormen met Cydectin, hierop zit geen wachttijd voor melk.

Eind oktober wordt nogmaals een tankmelkmonster onderzocht, er wordt naast wormen ook gekeken naar leverbot.

Als u een wormbesmetting vermoedt, of wilt weten hoe het zit, kunt u ook via de praktijk een tankmelkmonster laten onderzoeken. Als we in het najaar weer een actie hebben, kunt u dat in een van de volgende nieuwbrieven lezen.

Ook bij het jongvee komen regelmatig wormbesmettingen voor. Laat de jongste groepen niet te lang buiten lopen en let op verschijnselen van long- en maagdarmworm: hoesten, dunne mest, groeivertraging. Kalveren en pinken kunnen met Noromectin pour on worden behandeld.

### **Pinkengriepvaccinatie**

Om problemen met pinkengriep te voorkomen, is het verstandig om kalveren te vaccineren tegen pinkengriep. Het streven is om antilichaamtiters zo hoog mogelijk te hebben voordat de problemen in het najaar beginnen. Door deze maand te vaccineren en na 4-6 weken te booster wordt dit bereikt.

### **Vakanties**

Alleen Mathijs is nog op vakantie:

23-8-2024 t/m 15-9-2024: Mathijs Hana

**Met vriendelijke groet,  
Uw dierenartsen van Vallei & Wetering**