

Beste veehouder,

- Blauwtongvaccinatie en conclusies onderzoek
- Intramar LC vervangt Avuloxil

Utrechtseweg 4^b
3927 AV Renswoude

t +31 (0)318 743 456
f +31 (0)318 743 450

info@valleienwetering.nl
www.valleienwetering.nl

Situatie Bultavo (Blauwtong-vaccin)

We zijn sinds half maart al volop aan het vaccineren tegen blauwtong. Er zijn veel bedrijven die al hebben gevaccineerd, veel meer dan vorig jaar. Deze trend zien we landelijk. Gevolg hiervan is dat de entstof slecht verkrijgbaar is. De voorraad Bultavo dreigde zelfs op te raken, maar we hebben net op tijd weer wat binnen gekregen. We kunnen dus overal de 2^e entingen zoals gepland uitvoeren. De fabrikant heeft gewaarschuwd dat de beschikbaarheid wat minder is, maar we hopen toch dat we iedereen die wil vaccineren gewoon kunnen bedienen.

De lunchbijeenkomst die we georganiseerd hebben is afgelast. Er waren maar weinig aanmeldingen en de mensen die nog extra informatie wilden, hebben we al persoonlijk gesproken.

De 3 entstoffen die op de markt waren hadden allemaal een voorlopige registratie. Dit betekent dat ze niet vrij gebruikt mogen worden, maar toegelaten zijn tot een bepaalde datum. Inmiddels zijn ze echter alle 3 geregistreerd en zitten er dus geen beperkingen meer op het gebruik. De effectiviteit is dus voldoende bewezen om registratie mogelijk te maken.

Ons advies is om uw dieren (koeien en schapen) te vaccineren. Hieronder hebben we de conclusies van het GD-onderzoek en onze eigen enquête nog een keer neergezet. Mocht u nog extra informatie willen, dan kunt u dit met uw eigen dierenarts bespreken.

Conclusies en advies Blauwtongvaccinatie:

Antistoffen door een natuurlijke infectie of door vaccinatie geven bescherming tegen blauwtong. Doordat we vorig jaar waarschijnlijk zijn begonnen met vaccinatie toen het virus al rond ging, hebben we ook na vaccinatie toch zieke dieren gezien. Daarnaast hebben we te maken met een agressief virus.

Ons advies is voor dit jaar om de dieren tijdig te beschermen, dus voor het knuttenseizoen begint in april/mei.

Wij gebruiken dit jaar de Bultavo entstof om te gaan vaccineren. Deze laat in een onderzoekssituatie een goede bescherming zien tegen klinische verschijnselen en virusvermeerdering in het bloed (en dus ook bescherming van de vrucht). In de praktijk zal het succes ook mede afhangen van de algehele gezondheidstoestand van het dier. Vandaar ook dat we de meeste verschijnselen zagen bij pas afgekalfde dieren, aangezien deze vaak een wat verminderde weerstand hebben.

De basisvaccinatie met **Bultavo** bestaat uit 2 x vaccineren met 3 weken tussentijd. Als de dieren vorig jaar met Bultavo zijn gevaccineerd, volstaat een enkele herhalingsvaccinatie.

Als de koeien vorig jaar met **Syvazul** zijn geënt, moet voor een goede bescherming toch weer de basisvaccinatie met Bultavo worden uitgevoerd, dus 2 x enten met 3 weken tussentijd.

Avuloxil tijdelijk niet leverbaar

Al enige tijd is Avuloxil slecht leverbaar en op dit moment hebben we niets meer op voorraad. Als tijdelijke vervanger hebben we Intramar LC. Het gebruik van Intramar LC is hetzelfde als Avuloxil, de werkzame stof is hetzelfde en 1 kuur bestaat uit 3 injectoren, toe te dienen met 12 uur tussentijd. Intramar LC zit verpakt in dozen van **24 injectoren**, dus 2 keer zoveel als Avuloxil. Als 24 injectoren teveel is, kunnen ze ook per injector besteld worden. Hieronder vindt u de aanpassing van het Bedrijfsbehandelplan.

Aanpassing Bedrijfsbehandelplan 11-02-2025

- Bewaar dit formulier goed -

Tijdelijke vervanger van de Avuloxil alternatief Intramar LC

	Avuloxil	Intramar LC
REG NL	9427	LT/2/23/2747/001
Indicaties	Uierontsteking	Uierontsteking
Dosering	1 injector per 12 uur, 1.5 dag	1 injector per 12 uur, 1.5 dag
Toediening	Intramammair	Intramammair
Wachttijd vlees	7 dagen	7 dagen
Wachttijd melk	3.5 dagen	3.5 dagen
Opmerking	12 stuks in 1 doos	24 stuks in 1 doos

Met vriendelijke groet,
Uw dierenartsen van Vallei & Wetering